

Mordedura por araña bananera

Foneutrismo

¿Cómo identificarlas?

Las arañas del género *Phoneutria* tienen una **escópula**: cojín formado por miles de **pelos minúsculos**. Su cuerpo **mide entre 17-48 mm**, sin contar las patas.

Cuentan con **ocho ojos** dispuestos en **tres filas** en forma **2-4-2**.

Tienen una coloración de **grisácea a castaño oscuro** en el **cefalotórax**: unión de la cabeza y el tórax .



Las **patas** poseen varias **espinas negras** con **puntos amarillos** en la base de cada espina.

En el **abdomen** presentan dos filas con **manchas dorsales más claras**.

Poseen "**tenazas**" (quelíceros) en la parte frontal, cubierta con **vellos anaranjados**, que suelen tornarse **rojos** cuando la araña se encuentra **irritada**.



¿Qué se siente en una mordedura?

La mayoría de los **accidentes son leves** y sus manifestaciones **solo son locales**. Y los casos graves suelen ser en **ancianos y niños**.

Locales

Huellas visibles de la mordedura, con presencia de **dolor, hinchazón, enrojecimiento**, sensación de **cosquilleo** y pequeñas e involuntarias **contracciones musculares**.

Generales

Se presenta **dolor extendido** en el lugar de la mordedura, en **abdomen** y en **tórax**; además, **dolor de cabeza intenso** acompañado de sensación de **pesadez** y **sudoración** excesiva.

Solo 25 de los 195 casos reportados por mordedura de araña entre el 2006 y 2010 en Colombia fueron provocados por este género.

Para más información comunicarse al Serpentario de la Universidad de Antioquia del Grupo de Investigación Programa de Ofidismo/Escorpionismo:

 (+574)2192315

 serpentario@udea.edu.co

Créditos de la imagen: Jullieta Vásquez.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**



El conocimiento
es de todos

Minciencias