



Red para el
CONTROL de
TABACO en
MUJERES

**Antioquia
Colombia**



SUBREGIÓN
BAJO CAUCA
ANTIOQUEÑO



RED PARA EL CONTROL DE TABACO EN MUJERES, ANTIOQUIA-COLOMBIA

SUBREGIÓN BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO

El consumo de tabaco es la principal causa de muertes prevenibles en el mundo y es responsable de la morbilidad y la mortalidad asociadas a una serie de enfermedades no transmisibles como son el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, entre otras. Se estima que más de dos tercios de las muertes relacionadas con el tabaco, ocurren en países de bajos y medianos ingresos¹. En Colombia, el consumo de tabaco ha disminuido en hombres y mujeres entre 12 y 64 años de edad, entre 2008 y 2013 pasó de 24% a 18,8% en hombres y de 11% a 7,4% en mujeres². Sin embargo, en mujeres entre 18 y 34 años de edad la prevalencia en 2013 fue del 16%³.


Por lo anterior, se desarrolló un proyecto de investigación que tuvo como propósito crear una Red para el control de tabaco en mujeres en Antioquia, estableciendo capacidad comunitaria e institucional para promover esfuerzos para el control de tabaco relevantes para las mujeres. Para lograr dicho objetivo, se utilizaron dos

técnicas de recolección de información, la primera fue una encuesta poblacional entre el 2017 y 2018 a 4.383 mujeres mayores de 18 años en la que se utilizó una muestra probabilística y representativa para las zonas urbanas de cada una de las subregiones del departamento de Antioquia con la intención de identificar la prevalencia de consumo de productos derivados del tabaco y posibles factores asociados a dicho hábito.

La segunda técnica fue una entrevista semiestructurada realizada a 30 actores claves de cada una de las subregiones del departamento (3 por cada subregión y 6 para el Valle de Aburrá), en la que participaron funcionarios del sector salud, educación, deporte, cultura, comerciantes, fumadores, ex fumadores, entre otros.

En el gráfico 1 se presentan las prevalencias del consumo de productos de tabaco para el departamento.

Gráfico 1. Prevalencia de consumo de productos de tabaco en mujeres, por subregiones, Departamento de Antioquia, 2018



COMPONENTE CUANTITATIVO

Aspectos sociodemográficos

Del total de las mujeres encuestadas en el departamento de Antioquia, 286 residían en esta subregión distribuidas en los tres municipios seleccionados en el muestreo: 147 participantes de Caucasia (51%), 69 en El Bagre (24%) y 70 en el municipio de Zaragoza (25%).

El nivel educativo de la mayoría de mujeres fueron estudios de primaria completos (33%), seguido de aquellas que tienen secundaria completa (24%) y en una menor proporción

se encuentran las mujeres con estudios universitarios culminados (4%). Respecto al estrato socioeconómico se encontró que la mayoría de participantes pertenecen a los estratos bajos (1 y 2) con un 88%.


Más de la mitad (68%) de las mujeres encuestadas tienen ocupaciones en el ámbito doméstico, es decir, son amas de casa o trabajan en servicios generales, y el 82% manifestaron tener cobertura en el régimen subsidiado.

¹ Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el control del tabaco en la Región de las Américas, 2018. Washington, D.C.: OPS; 2018. [Internet] [Consultado 2019 May 15] Disponible en: http://www.ipsuss.cl/ipsuss/site/artic/20180829/asocfile/20180829181403/informe_control_del_tabaco_america_2018.pdf

² Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, CENDEX, S.E.I.S.A. Encuesta Nacional de Salud 2007. Primera edición. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social; 2009

³ Colombia. Ministerio de salud y Protección Social. Panorama de la salud de los escolares en Colombia. [Internet] [Consultado 2019 May 15] Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Panorama-de-la-salud-de-los-escolares-en-Colombia.aspx>

Gráfico 2. Porcentaje de consumo actual o pasado de productos de tabaco en mujeres, subregión Bajo Cauca, Departamento de Antioquia, 2018



Consumo de tabaco y sus derivados

La mayoría (82%) de mujeres de la subregión Bajo Cauca de Antioquia manifestaron no haber consumido tabaco a lo largo de su vida y en menor proporción (5%) afirmaron que actualmente consumen algún derivado del tabaco (Gráfico 2).

El 68% de las mujeres con consumo actual de productos de tabaco consume cigarrillo con filtro, el 25% reportó consumo combinado de cigarrillo mentolado y cigarrillo con filtro, el 6% cigarrillo mentolado, y el 1% consumen cigarrillo sin filtro.

Cuando se le indagó a las mujeres fumadoras o exfumadoras del Bajo Cauca Antioqueño por las razones del inicio de consumo, se

encontró que, del total de las participantes de los tres municipios, el 56% coinciden en que la curiosidad es el principal factor que impulsa a las personas a probar el tabaco y sus derivados. Por su parte, el 30% de las encuestadas manifiestan que la influencia familiar es uno de los aspectos que más inciden en dicho comienzo y el 25% lo atribuyen a la influencia de los amigos y por moda.

Respecto al lugar en el cual adquieren los productos de tabaco, el 67% de las mujeres consumidoras de la subregión habitualmente los adquieren en mercados y supermercados, y el 33% en las tiendas de barrio.

Apoyo profesional para la cesación

Respecto al apoyo profesional al momento de la cesación, el 63% de las participantes afirmaron que el personal de salud en algún momento les ha preguntado si fuma y al 65% de ellas les hablaron acerca de los perjuicios del consumo de tabaco.

Solamente el 4% de las mujeres que consumen actualmente algún producto derivado del tabaco informaron que han buscado ayuda para cesar su consumo. De estas, el 59% afirmaron haber recibido tratamiento u orientación de algún tipo para llevar a cabo dicho proceso.

Conocimientos sobre los productos de tabaco y sus derivados

Más del 95% de las mujeres encuestadas en la subregión Bajo Cauca del departamento de Antioquia y que afirmaron conocer los productos derivados del tabaco tales como el cigarrillo sin filtro, armados a mano, tabaco, pipas llenas de tabaco y pipa de nargüile, consideran que son muy perjudiciales para la salud. El 99% considera que el cigarrillo electrónico es nocivo.

Por su parte, el 94% de las mujeres encuestadas también afirmaron que el humo de cigarrillo que respiran los no fumadores es muy perjudicial para la salud.

Frente a la percepción que tienen las participantes encuestadas frente a lo adictivos que es el tabaco o productos derivados del

mismo, el 95% o más consideran que son muy adictivos, las pipas llenas de tabaco, tabaco puro, y la pipa de nargüile y el 94% lo afirma para el cigarrillo electrónico.

Respecto a las enfermedades que las encuestadas consideran que puede causar el consumo de tabaco y sus productos derivados, el 94% o más coinciden en que su consumo produce enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón. El 87% con enfermedades del corazón, y solamente el 55% de las encuestadas asocia dichas enfermedades a bebés que nacen con bajo peso.

Conocimiento de la Ley 1335 de 2009 (Ley para el control de tabaco)

La mayoría (80%) de las encuestadas afirman no conocer la ley o no saber de su existencia, lo que implica un reto para las organizaciones, principalmente gubernamentales. (Gráfico 3).


La mayoría de mujeres del Bajo Cauca Antioqueño (94%) afirmaron haber visto venta por unidad o al menudeo de tabaco y sus productos derivados en su municipio de residencia. El 78% ha visto venta de estos productos a menores de edad. En menor cantidad (1%) han visto máquinas expendedoras o dispensadoras de tabaco.

Cuando se les indagó por la publicidad de los productos de tabaco se encontró que la mayoría (99%) concuerda en no haber visto alguna difusión al respecto ni en bares, cafés

o centros comerciales. Solamente el 1% de las encuestadas refirieron haber visto o escuchado propagandas alusivas al tabaco en la televisión, la radio, periódicos o revistas. En general, las mujeres del Bajo Cauca coinciden que en sus municipios no es común o no se realizan actividades en las que se promocionen los derivados del tabaco.

El 17% de las participantes de los tres municipios afirmaron que vieron personas consumiendo productos derivados de tabaco en oficinas o edificios gubernamentales, el 13% recuerdan haber visto consumir en el transporte público. En menor proporción manifestaron verlo en instituciones de salud (2%) de sus municipios. Según la ley 1335 fumar en estos lugares públicos está prohibido.

Gráfico 3. Porcentaje del conocimiento en mujeres sobre la ley antitabaco o para el control de tabaco en Colombia, subregión Bajo Cauca, Departamento de Antioquia, 2018



COMPONENTE CUALITATIVO

En las entrevistas realizadas a actores claves de la subregión Bajo Cauca se encontró lo siguiente:

- **Barreras para la efectividad en la implementación de los programas de prevención del consumo de tabaco y sus derivados:** Para los participantes las principales barreras son los pocos recursos destinados para las actividades de salud pública que poseen los municipios y las instituciones de salud de la subregión y el hecho que los efectos de la prevención no son visibles a corto plazo. Así mismo, sugieren que la falta de compromiso y de voluntad política por parte de los gobernantes de turno que impide dar continuidad a planes, programas y proyectos que se vienen realizando orientados a la prevención del consumo de tabaco.
- **Desafíos para la implementación de los programas de cesación:** En el Bajo Cauca antioqueño la mayoría de los entrevistados afirmaron que no existen programas de cesación para el consumo de tabaco en sus

municipios de residencia o si existen, los desconocen. Los participantes manifestaron la necesidad de contar con programas de cesación con personal especializado y con gran capacidad para persuadir a los demás, de modo tal que los convenza para abandonar sus hábitos tabáquicos.

- **Estrategias para el cumplimiento de la ley antitabaco:** Todos los entrevistados coinciden en no conocer esta ley y consideran que no se hace una difusión adecuada ni se cumplen las sanciones estipuladas. En ese sentido proponen generar sanciones económicas y pedagógicas para quienes incumplen lo estipulado en la ley antitabaco. También afirman que se requiere una población más empoderada que haga respetar sus derechos a un ambiente libre de humo de tabaco y exigir una política pública orientada a la prevención y al control del consumo de cigarrillo.

Recomendaciones

- Fortalecer procesos educativos en las escuelas, colegios y universidades sobre los riesgos que representa el consumo del tabaco y sus derivados en la salud no solo del consumidor, sino también de su entorno más próximo.
- Realizar capacitación en cesación al personal de salud para brindar apoyo u orientación a las personas que desean cesar el consumo de tabaco y sus derivados. Adicional a ello, se requiere fomentar programas de cesación.
- Generar procesos de capacitación con la Policía, tenderos, personal de restaurantes, cafés, bares y demás establecimientos

comerciales abiertos al público, transporte público y población en general acerca de la ley antitabaco o para el control del tabaco, haciendo especial énfasis en la prohibición de venta al menudeo, a menores de edad, y fumar en sitios públicos. En ese mismo sentido, se requiere una aplicación rigurosa de lo estipulado en dicha normativa.

- Brindar capacitaciones a la población en general del consumo de tabaco y de las nuevas formas de consumo de nicotina como es el cigarrillo electrónico, de los riesgos que estos traen para la salud y el nivel de adicción que pueden alcanzar en el consumidor.



Este proyecto fue patrocinado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, con la participación de la Universidad de Alabama en Birmingham, y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.



Agradecimientos

El proyecto agradece la colaboración de la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Salud de Medellín, Alcaldías de los municipios participantes, Medicáncer, encuestadores, supervisores, participantes de las entrevistas, y mujeres participantes en las encuestas en todo Antioquia.

Equipo investigador

- Isabel Cristina Scarinci, investigadora principal. Universidad de Alabama en Birmingham
- Isabel Cristina Garcés Palacio, investigadora principal. Universidad de Antioquia
- Jennifer Marcela López Ríos, coordinadora. Universidad de Antioquia
- Niltón Edu Montoya Gómez, estadístico. Universidad de Antioquia
- Sebastián Mejía Ríos, cartografía. Universidad de Antioquia

Integrantes voluntarios de la Red para el Control de Tabaco

Subregión Bajo Cauca

Ferney Herrera Mesa
Johana Prada Acevedo

Subregión Norte

Eliana María Ramírez
Yimmy Alejandro Jaramillo

Subregión Suroeste

Diana Carolina Cardona Ochoa
Isabel Cristina Restrepo Acosta

Subregión Magdalena Medio

Carolina Linares Rueda
Leidy Marcela Pulgarín Querubín

Subregión Occidente

Diana Catalina Acebedo Panesso
Julieth Cano Pérez

Subregión Urabá

Betilda Teherán Beleño
Janeth Cristina Castaño Jiménez

Subregión Nordeste

Luz Dary Hoyos
Wendy Estefanía Alzate Alzate

Subregión Oriente

Luz Esneda Galvis Henao
Sandra Janeth Ospina Orozco

Subregión Valle de Aburrá

Marisol González Rojas
Ximena Alexandra Ríos Peña

Diseño gráfico y editorial

Jeniffer Lasso Castañeda, Comunicadora Gráfica Publicitaria

¿Estás interesado en realizar un curso virtual gratuito en prevención, manejo del tabaquismo, y nuevas formas de consumo de la nicotina? Escríbenos al correo icristina.garces@udea.edu.co. Si deseas obtener este boletín en versión digital o resultados de otras subregiones del departamento de Antioquia puedes escribirnos o ingresar a la página saludpublica.udea.edu.co

