

Mordedura por Tarántula

¿Cómo identificarlas?



Las arañas de la familia **Theraphosidae** se reconocen fácilmente por ser de **gran tamaño**.

Su cuerpo excede los **50 mm**, y en ocasiones, alcanzan hasta **120 mm**.

Están recubiertas de abundantes **setas**, las cuales se parecen a los pelos de los mamíferos.




¡No son de importancia médica!

- El **envenenamiento** causado por la mordedura de estas arañas provoca **síntomas locales** como **dolor**, **hinchazón** e **inflamación** y a veces muerte del tejido.
- El **tratamiento** se reduce a la administración de **analgésicos**, y en **retirar** las **setas**, que generan síntomas alérgicos, porque son urticantes.
- Incluso hay casos de **mordeduras** que **no presentan síntomas** debido probablemente a la falta de inyección de veneno.

113 de los 195 casos reportados por mordedura de araña entre el 2006 y 2010 en Colombia fueron provocados por el género ***Theraphosa spp.***

Para más información comunicarse al Serpentario de la Universidad de Antioquia del Grupo de Investigación Programa de Ofidismo/Escorpionismo:

 (+574)2192315

 serpentario@udea.edu.co

Créditos de la imagen: Serpentario UdeA.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**



El conocimiento
es de todos

Minciencias